

مادرداوت

مادرامايسين ۱٪
گرانول مخلوط در دان



گروه دارويي: كوكسيديو واستات يونوفوره

تركيب: هر كيلوگرم مادرداوت حاوي ۱۰ گرم مادرامايسين مى باشد.

موارد مصرف:

مادرامايسين جهت كترل، پيشگيري و درمان كوكسيديوز در جوجه هاک گوشتي، پولت و بوقلمون که ناشی از گونه هاي مختلف آيمريا مثل تنلا، نكاتريكس، ماكسيما، آسرولينا و ميواتي استفاده مى شود، و همچنان باعث افزایش وزن و بهبود ضريب تبديل مى گردد.

مقدار و روش مصرف: ۵۰۰ گرم در يك تن خوراک جوجه گوشتي مصرف شود.

تداخل دارويي:

- همزمان با ديگر كوكسيديو استاتهای يونوفوره مصرف نشود.

- از مصرف اين دارو ۷ روز قبل، ۷ روز بعد و در حين مصرف تيامولين پرهيز شود.

موارد منع مصرف: در مرغان تخمگذار و مرغ مادر و ديگر گونه هاي پرندگان مصرف نشود.

زمان پرهيز از مصرف: مصرف دارو ۵ روز پيش از کشتار متوقف شود.

موارد احتياط:

- دور از دسترس کودکان نگهداري شود.

در هنگام حمل و نقل و مخلوط نمودن از دستکش، لباس مخصوص و ماسک ضد غبار استفاده نمایيد.

- در صورت تماس محصول با چشم سریعاً با آب شستشو داده شود.

توصيه: برای یکنواختی بیشتر مکمل در خوراک لازم است ابتدا اختلاط با حجمهاي كوچکتر خوراک صورت گيرد و سپس با خوراک نهايی مخلوط شود.

شرایط نگهداري: در جاي خشک، دمای پایین تر از ۲۵ درجه سانتي گراد و دور از تابش مستقيم خورشید نگهداري شود.

بسته بندی: پاکت ۵ کيلوگرمی