



نئوسیت ۲۰۰

نئومایسین سولفات ۲۰٪
پودر محلول در آب

گروه دارویی: آنتی بیوتیک آمینو گلیکوزیدی

ترکیب: هر گرم حاوی ۲۰۰ میلی گرم نئومایسین سولفات می باشد.

موارد مصرف: نئوسیت ۲۰۰ به شکل خوراکی جهت پیشگیری و درمان آنتریت ها و اسهال با منشأ باکتریایی در دام و طیور استفاده می شود.

مقدار و روش مصرف:

- طیور: یک گرم نئوسیت ۲۰۰ در یک لیتر آب آشامیدنی به مدت ۵ - ۳ روز
 - گوسفند، بز و گوساله: یک گرم نئوسیت ۲۰۰ به ازاء هر ۲۵ کیلوگرم وزن بدن تا رفع کامل علائم بیماری.
- عوارض جانبی:** مصرف طولانی مدت دارو به دلیل ایجاد اختلال در میکروفلور دستگاه گوارش منجر به بروز اسهال می شود.

زمان پرهیز از مصرف: در طیور تخمگذار ۱۴ روز پیش از شروع تخمگذاری و در طیور گوشتی ۵ روز، در بوقلمون ۱۴ روز و در دام بزرگ ۵ روز قبل از کشتار مصرف دارو متوقف شود.

موارد احتیاط: دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

شرایط نگهداری: در جای خشک، دمای پایین تر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم خورشید نگهداری شود.

بسته بندی: ساشه ۵۰۰ گرمی