



## وتاکوکس ۱۲۰

سالینومایسین ۱۲ %  
پودر مخلوط در دان

**گروه دارویی:** کوکسیدیو استات یونوفوره

**ترکیب:** هر کیلوگرم وتاکوکس ۱۲۰ حاوی ۱۲۰ گرم سالینومایسین سدیم می باشد.

**موارد مصرف:** این دارو جهت پیشگیری، کنترل و درمان کوکسیدیوز طیور گوشتی ناشی از گونه های مختلف آیمريا مثل نکاتریس، میواتی، ماکسیم، آسرولینا، تنلا و برونتی بکار می رود.

### مقدار و روش مصرف:

- جوجه گوشتی: ۵۰۰ گرم وتاکوکس ۱۲۰ در هر تن خوراک از یک روزگی تا ۵ روز قبل از کشتار
- پولت تخمگذار: ۳۵۰ تا ۵۰۰ گرم وتاکوکس ۱۲۰ در هر تن خوراک از یک روزگی تا ۷ روز قبل از شروع تخمگذاری

### تداخل دارویی:

- از استفاده همزمان این دارو با سایر کوکسیدیو استات های یونوفوره باید خودداری کرد.
- از مصرف این دارو ۷ روز قبل، ۷ روز بعد و در حین مصرف تیامولین می باشد پرهیز گردد.

**زمان پرهیز از مصرف:** ۵ روز قبل از کشتار جوجه های گوشتی و ۷ روز قبل از شروع تخمگذاری پولت ها از مصرف دارو خودداری گردد.

### توجه:

- مصرف این محصول می تواند برای اسب و بوقلمون های بالغ کشنده باشد.
- در مرغان تخمگذاری که تخم مرغ آنها مصرف انسانی دارند استفاده نشود.

### احتیاط:

- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
- هنگام مخلوط کردن وتاکوکس ۱۲۰ با خوراک از لباس محافظ و ماسک استفاده گردد.
- در صورت تماس دارو با چشم، سریعاً چشم با مقدار زیادی آب شستشو داده شود.

**توصیه:** برای یکنواختی بیشتر توزیع وتاکوکس ۱۲۰ در دان طیور ابتدا اختلاط با مقدار کمی دان، مکمل معدنی و یا سایر اجزاء دان صورت گرفته سپس به دقت و به طور کامل با دان نهایی مخلوط شود.

**شرایط نگهداری:** در جای خشک، دمای بایین تر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم خورشید نگهداری شود.

**بسته بندی:** پاکت ۵ کیلو گرمی