



وتوکسی ۵۰۰

اکسی تتراسایکلین ۵۰٪
پودر مخلوط در دان

گروه دارویی: آنتی بیوتیک

ترکیب: هر کیلوگرم وتوکسی ۵۰۰ حاوی ۵۰۰ گرم اکسی تتراسایکلین می باشد.

موارد مصرف:

جهت درمان عفونت های باکتریایی اولیه و ثانویه حساس به اکسی تتراسایکلین، مانند CRD، سینوویت عفونی، عفونت های قسمت فوقانی دستگاه تنفس، عفونت های دستگاه گوارش، کوریزا و عفونت های حاصله بعد از استرس در طیور مورد استفاده قرار می گیرد.

مقدار و روش مصرف:

درمان: ۸۰۰ گرم پودر در یک تن دان به مدت ۲ تا ۵ روز و یا طبق دستور دامپزشک مصرف شود.

تداخل دارویی:

این دارو نباید همراه پنی سیلین ها، استرپتومایسین، باسیتراسین، انروفلوکساسین، پلی میکسین و بی کربنات سدیم و همچنین ترکیبات حاوی کاتیون های فلزی آهن، منیزیم و کلسیم مصرف شود.

زمان پرهیز از مصرف:

• مصرف دارو ۵ تا ۷ روز قبل از کشتار قطع شود.

• تخم مرغ طیور تحت درمان ۷ تا ۱۰ روز پس از قطع دارو قابل مصرف می باشد.

شرایط نگهداری: در جای خشک، دمای پایین تر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم خورشید نگهداری شود.

بسته بندی: پاکت ۵ کیلوگرمی