



کلیستیت - ال

کلیستین سولفات ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد
محلول خوراکی

گروه دارویی: آنتی بیوتیک

ترکیب: هر میلی لیتر کلیستیت - ال حاوی ۲ میلیون واحد کلیستین سولفات می باشد.

موارد مصرف: کلیستیت - ال بر علیه باکتری های گرم منفی مانند اشیریشیاکلی، هموفیلوس، سالمونلاها و کامپلیوباکترها استفاده می شود.

مقدار و روش مصرف:

• طیور: روزانه ۷۵۰۰۰ واحد کلیستین به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن، که معادل ۰/۲۵ میلی لیتر کلیستیت - ال در هر لیتر آب آشامیدنی است برای ۳ روز متوالی استفاده شود.

• گوساله و بره: ۵۰۰۰۰ واحد کلیستین به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن، که معادل ۰/۲۵ میلی لیتر کلیستیت - ال در هر لیتر آب آشامیدنی یا شیر خشک است برای ۳ روز متوالی (۲ بار در روز) استفاده شود.

زمان پرهیز از مصرف: در جوجه های گوشتی ۲ روز و در گوساله و بره ۷ روز قبل از کشتار مصرف دارو متوقف شود.

موارد احتیاط: دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

شرایط نگهداری: در جای خشک، دمای پایین تر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم خورشید نگهداری شود.

بسته بندی: بطری یک لیتری