



## فسفووت

فسفومایسین ۲۵٪

پودر محلول در آب

**ترکیب:** آنتی بیوتیک وسیع الطیف بر علیه باکتری های گرم منفی و گرم مثبت  
**موارد مصرف:** در طیور گوشتی و مرغ مادر به عنوان انتخاب اول در پیشگیری و درمان بیماری های کلی باسیلوز، تورم ناف، سالمونلوز، کریزای عفونی، پاستورلوز، لیستریوز و ورم مفاصل استافیلولوکوکی استفاده می گردد.

**دوز درمانی:** ۱۶۰ میلی گرم فسفووت برای هر کیلو وزن زنده در روز به مدت ۲ الی ۵ روز متوالی  
**نحوه محاسبه دوز مصرف:**

دوز درمانی: متوسط وزن پرنده در آخرین روز درمان (کیلوگرم) × تعداد پرنده × ۰/۱۶ = میزان فسفووت  
صرفی در روز (گرم)

### نحوه افزودن دارو به آب مصرف:

- ۱- ابتدا میزان فسفووت مورد نیاز را در چند لیتر آب ولرم (۳۵-۴۵ درجه سانتیگراد) حل کنید.
- ۲- میزان آب مصرف اولیه مصرف را تعیین و مقدار فسفووت محاسبه شده را به آن میزان اضافه کنید.
- ۳- بعد از مصرف آب حاوی دارو، آب تازه و بدون دارو را به آبخوری اضافه کنید.

**تداخلات دارویی:** تاکنون اثر آنتاگونیستی بین این دارو و سایر داروهای محلول در آب یا افزودنی ها به جیره که در طیور و سایر دام های اهلی رایج هستند گزارش نشده است. اثر هم افزایی مناسبی بین این دارو و اریترومایسین، تایلوزین، فلوروفیکل، آمپی سیلین، جنتامایسین و تری متوبریم مشاهده شده است.

**موارد احتیاط:** دور از دسترس کودکان قرار گیرد.

### زمان پرهیز از مصرف:

• درمان ۷ روز قبل از کشتار قطع گردد.

• در طیور تخم گذاری که تخم آنها مصرف انسانی دارد مصرف نگردد

**شرایط نگهداری:** در جای خشک، دمای پایین تر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم خورشید نگهداری شود.

**بسته بندی:** ساشه ۵۰۰ گرمی داخل جعبه