



MYOGASTER-E

Composition: Per ml: 100 mg vitamin E acetate

100 ml

Indications:
Prevention or treatment of: muscular dystrophy (Stiff Lamb Disease) in cattle, sheep, goats, pigs; encephalomalacia, exudative diathesis, depression in poultry; diminished fertility (embryonic death) in poultry.

Dosage:
All animals: 5 -10ml/case
Repeat the injection after 1 month (in case of pregnancy insufficient).
Poultry: 10 ml per 100 litres of drinking water during

V.M.D. nvba - Berendink 74 - B-2370 ARENDONK BELGIUM

تحریک رشد

تقویت سیستم ایمنی

افزایش میزان تولید و افزایش میزان باروری

پیشگیری و درمان عوارض کمبود ویتامین E

بالاترین میزان ویتامین E و سلنیوم نسبت به محصولات مشابه

محلول تزریقی
مایو گستر
MYOGASTER-E

VMD
S.A. V.M.D. N.V.
WE DO IT FOR THE BEAST®

MYOGASTER-E

POUYADAROU LTD.

ویتامین E یکی از ویتامینهای محلول در چربی بوده که در بدن دام نقش بسزایی در افزایش عملکرد سیستم ایمنی، از بین بردن رادیکالهای آزاد و کاهش اثرات منفی وجود فلزات سنگین در جیره غذایی ایفا میکند. سلنیوم نیز یک آنتی اکسیدان داخل سلولی و جزئی از آنزیم گلوکوتایون پراکسیداز است و باعث تخریب پراکسیدها و سایر ترکیبات مضر ایجاد شده در داخل سلول میشود. مصرف ترکیب این دو در گاو به طور موفقیت آمیزی باعث کاهش وقوع جفت ماندگی، متريت، کیستهای تخمدانی و سقط جنین در سطح گله می شود.

ترکیبات

هر میلی لیتر دارو شامل ۱۰۰mg ویتامین E و ۲mg سدیم سلنیت پنتاهیدرات می باشد.

موارد مصرف

گوسفند و گاو: دیستروفي عضلانی (بیماری عضله سفید)، عوارض ثانویه در ورم پستان گاوهای شیری، ابقاء غشاء جنینی، سقط های مکرر، اسهال، جفت ماندگی
اسب: بیماری عضله سفید در کره اسب از شیر گرفته شده، ضعف بدنی
طیور: دیستروفي عضلانی، آنسفالومالاسی، دیاتریزاکسوداتیو و کاهش جوجه در آوری

میزان مصرف

گاو و اسب: 5-10mg/case گوسفند و بز: 1ml/10kg b.w طیور: 100ml/1000L d.w

روش مصرف

دارو به صورت عضلانی تزریق شود.

عوارض جانبی

مصرف بیش از اندازه سلنیوم اثرات سمی دارد. ویتامین E سمیت کمی دارد ولی احتمال بروز واکنشهای آنافیلاکتیک بخصوص در اسب وجود دارد.

زمان پرهیز از مصرف

ندارد.

موارد احتیاط

از تزریق بیش از ۱۵ میلی لیتر دارو در یک نقطه پرهیز شود. از مخلوط کردن دارو با سایر داروها اجتناب شود.

شرایط نگهداری

در دمای ۲ تا ۲۵ درجه سانتیگراد و دور از نور مستقیم نگهداری شود. از یخ زدگی دارو محافظت شود.

بسته بندی

ویال ۱۰۰ میلی لیتری



تهران، بلوار میرداماد
پلاک ۱۲۵، طبقه سوم
تلفن: ۲۲۲۵۸۵۰۴
فکس: ۲۲۲۲۱۲۱۵
groupsana.com